hybridsorte	reife (ca. tage)	verwendung	kolbenlänge (ca. cm)	kolben Ø (ca. cm)	kornreihen	kolbengewicht (ca. gramm)	resistenz
sweet nugget	sehr früh (69)	fm	20-22	5,0-5,3 je nach reife	12-14	250-330 je nach reife	-
takeoff	früh (72)	fm	20-22	5,1	16-18	290-330	-
column	früh (74)	fm/ind	19-22	5,3	16-18	320-360	IR: et, mdmv
khan	mittelfrüh (76)	fm/ind	22-23	5,3	16-18	340-380	HR: ps, mdmv IR: et
fragman	mittel (77)	fm	21-22	5,4	16-18	330-370	HR:mdmv
macaron	mittel (79)	ind/fm	21-23	5,6	16-18	350-390	HR: ps IR: et

column f1 eine anpassungsfähige und standfeste sorte für die verarbeitung | agiles jugendwachstum | gute frühzeitigkeit - ca. 74 tage | interessante qualität und sehr guter geschmack | gute kolbenlänge und füllung | einfach zu entlieschen | trotz früher reife hohes ertragspotential und gutes erntefenster | HR maisrost, IR maisverzwergungsvirus und turcicum blattflecken |







resistenzen

- **sw** – bakterienwelke (erwinia stewartii)
- **ps** – maisrost (puccinia sorghi)
- **et** – turcicum blattflecken (exserohilum turcicum)
- **mdmv** – maisverzwergungsvirus (potyviridae virus family)
  - **HR** – hohe resistenz
  - **IR** – intermediäre resistenz







